

PRIMEIRO REGISTRO DO CAURÉ *Falco rufigularis* (AVES: FALCONIDAE) NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SUDESTE DO BRASIL¹

FIRST RECORD OF THE BAT FALCON *Falco rufigularis* (AVES: FALCONIDAE) IN THE MUNICIPALITY OF SÃO PAULO, SOUTHEASTERN BRAZIL)¹

Bianca Matinata², Juliana França³, Vitor Suzuki de Carvalho⁴, Fabio Schunck^{5,6}

RESUMO – O cauré *Falco rufigularis* possui uma ampla distribuição entre o sul da América do Norte e sul da América do Sul, ocorrendo em quase todos os estados do Brasil, incluindo o estado de São Paulo, sudeste do país, onde é mais comum na sua porção central e oeste. Em abril de 2026 dois indivíduos foram registrados na região norte da cidade de São Paulo, próximo da Serra da Cantareira, indicando os primeiros registros para o município de São Paulo e uma possível chegada proveniente do interior do estado, um padrão já observado em outras espécies de aves. Os falcões estavam usando uma área urbana arborizada e foram observados por poucos dias. Estes registros marcam o início desta nova ocorrência geográfica e possibilitam um monitoramento futuro desta espécie na maior metrópole da América do Sul.

Palavras-chave: Mata Atlântica, Serra da Cantareira, Aves urbanas, História natural.

ABSTRACT - The Bat Falcon *Falco rufigularis* has a wide distribution between southern North America and southern South America, occurring in almost all Brazilian states, including the state of São Paulo in the southeast of the country, where it is more common in its central and western portions. In April 2026, two individuals were recorded in the northern region of the city of São Paulo, near the Serra da Cantareira mountain range, indicating the first records for the municipality of São Paulo and a possible arrival from the interior of the state, a pattern already observed in other bird species. The Falcons were using a wooded urban area and were observed for a few days. These records mark the beginning of this new geographic occurrence and allow for future monitoring of this species in the largest urban area in South America.

Keywords: Atlantic Forest, Serra da Cantareira, Urban birds, Natural history.

¹ Recebido em 29.05.2026. Aceito para publicação em 08.08.2026. Publicado em 16.09.2026.

² Legado das Águas, Rodovia Régis Bittencourt, Km 349, 11850-000, Miracatu, SP, Brasil, <https://orcid.org/0000-0002-9307-218X>

³ Instituto Ampara Animal, Av. Prof. Vicente Rao, 519, 04636-000, São Paulo, SP, Brasil, <https://orcid.org/0009-0007-5333-2657>

⁴ Diretoria de Biodiversidade e Biotecnologia, Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Av. Professor Frederico Hermann Junior, 345, 05459-900, São Paulo, SP, Brasil, <https://orcid.org/0009-0004-5168-979X>

⁵ Pesquisador independente. Av. Eugênio Bartolomai, 386, 04785-040, São Paulo, SP, Brasil, <https://orcid.org/000-0002-0974-2655>

⁶ Autor para correspondência: Fabio Schunck - fabio_schunck@yahoo.com.br

1 INTRODUÇÃO

O cauré *Falco rufigularis* Daudin, 1800, é uma espécie de falcão de pequeno porte (26 cm de comprimento), com ampla distribuição em florestas úmidas e secas da região neotropical, ocorrendo do norte do México ao norte da Argentina. No Brasil está presente em quase todo o território, exceto em alguns estados da região nordeste (Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe) e no Rio Grande do Sul, onde os poucos registros estão no extremo norte do estado (Sick 1997, Bencke et al. 2010, Rivas-Fuenzalida et al. 2025). No estado de São Paulo sua presença sempre foi atribuída à porção central e oeste (Willis e Oniki 2003), mas publicações recentes mostram uma ocorrência pouco conhecida para a região leste, incluindo localidades do planalto, como a região de Bananal (Schunck et al. 2018) e litoral, como Bertioja (Bokermann e Pivelli 2019).

2 MATERIAL E MÉTODOS


Os autores vêm realizando observações de aves e pesquisas ornitológicas na cidade de São Paulo

em diferentes períodos, sendo que o autor FS desenvolve este tipo de atividade desde o ano 2000 e os autores BM, JF e VSC vêm observando aves na Vila Albertina (23°27'06.4"S, 46°37'01"W; 792 m), região norte da cidade de São Paulo desde março de 2026. Este bairro arborizado está localizado a cerca de 1 km do limite sul do Parque Estadual Cantareira, importante unidade de conservação do estado de São Paulo para a biodiversidade (Figura 1).

As observações foram realizadas com uso de binóculo Solognac 10x42 e os registros foram documentados com câmeras Nikon Coolpix P950 e Canon Powershot SX 70 HS. Os dados obtidos em campo (listas de espécies e fotos) são disponibilizados nas plataformas online de observação de aves eBird (<https://ebird.org/home>, listas de espécies identificadas com o acrônimo S) e WikiAves (<https://www.wikiaves.com.br>, imagens identificadas com WA). A taxonomia e os nomes científicos utilizados seguem a Lista de Aves do Brasil, elaborada pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (Pacheco et al. 2021).

Figura 1. Localização do registro do cauré *Falco rufigularis* no município de São Paulo, SP. A. Localização do estado de São Paulo no sudeste do Brasil (área branca) e B. Localização do município de São Paulo na porção leste do estado de São Paulo (contorno menor branco). Imagem maior. Localização do município de São Paulo (linha branca), do Parque Estadual da Cantareira (linha verde) e da localidade do registro do cauré na região norte do município (asterisco branco). Fonte: Google Earth (image Landsat / Copernicus 2015).

Figure 1. Location of the Bat Falcon *Falco rufigularis* sighting in the municipality of São Paulo, SP. A. Location of the state of São Paulo in southeastern Brazil (white area) and B. Location of the municipality of São Paulo in the eastern portion of the state of São Paulo (smaller white outline). Larger image. Location of the municipality of São Paulo (white line), the Cantareira State Park (green line), and the Bat Falcon sighting location in the northern region of the municipality (white asterisk). Source: Google Earth (Landsat image / Copernicus 2015).




3 RESULTADOS

No dia 13 de abril de 2026, por volta das 13h30, um indivíduo adulto de cauré foi registrado na Vila

Albertina quando estava vocalizando em voo, pousando na sequência em uma torre de um heliponto existente no local, onde permaneceu por 25 minutos até ir embora (Figura 2).

Figura 2. Indivíduo solitário de cauré *Falco rufigularis* registrado em torre de heliponto, após ser detectado pela vocalização (imagens A e B). Fotos: Juliana França (13 de abril de 2026).

Figure 2. A solitary individual of the Bat Falcon *Falco rufigularis* recorded on a helipad tower, after being detected by its vocalization (images A and B). Photos: Juliana França (April 13, 2026).



No dia 18 de abril de 2026, por volta das 17h40, dois indivíduos foram observados em voo na mesma localidade, vocalizando e interagindo na mesma torre do heliponto (Figura 3 e WA7628517), sendo observados por cerca de 50 minutos (S321319392 e S323716663).

No dia quatro de maio, novamente um indivíduo foi detectado em voo e vocalizando no mesmo bairro (S332344018). O contato durou cerca de um 1 minuto e não foi documentado. Após os registros de campo, as aves não foram mais registradas na região, mesmo com observações diárias feitas pelos autores BM e JF.

Figura 3. Indivíduos de cauré *Falco rufigularis* registrados em interação no mesmo local da figura 2. A. Aves pousadas e B. aves interagindo, na sequência. Fotos: Vitor Suzuki de Carvalho (18 de abril de 2026).

Figure 3. Individuals of the Bat Falcon *Falco rufigularis* recorded interacting at the same location as in figure 1. A. Birds perched and B. Birds interacting, in sequence. Photos: Vitor Suzuki de Carvalho (April 18, 2026).



4 DISCUSSÃO

Os registros feitos na zona norte da cidade de São Paulo são os primeiros de cauré conhecidos para o município de São Paulo, um dos mais estudados do Brasil, com mais de 200 anos de conhecimento ornitológico produzido por diferentes naturalistas e pesquisadores (Schunck 2008, Figueiredo 2020, São Paulo 2025) e centenas de observadores e fotógrafos de aves (eBird 2026, WikiAves 2026).

A região norte da cidade de São Paulo, onde se encontra a Serra da Cantareira e outras áreas naturais, vem sendo destaque para boa parte dos primeiros registros de espécies de aves do município de São Paulo nas últimas décadas. Entre estes registros estão o coró-coró *Mesembrinibis cayennensis* (Gmelin, 1789) (Antunes et al. 2008), o cabecinha-castanha *Thlypopsis pyrrhocomma*

Burns et al. 2016 (Dores e Melo 2020) e o gavião-preto *Urubitinga urubitinga* (Gmelin, 1788) (Schunck et al. 2025), entre outras, sendo espécies com registros mais comuns no interior do estado de São Paulo, segundo Willis e Oniki (2003). Portanto, os registros do cauré feitos no bairro Vila Albertina e próximos da Serra da Cantareira, podem ser mais um exemplo de aves que provavelmente chegaram do interior do estado, e que encontraram na região, mesmo que por poucos dias, condições ambientais proporcionadas tanto pela área natural da Cantareira como pela área urbana arborizada da cidade, sendo um falcão que vive em ambos os tipos de habitats (Pallinger e Menq 2021). Estes registros destacam ainda mais a importância da Serra da Cantareira para as aves, sendo uma região com 326 espécies já registradas ao longo dos anos (Tonetti et al. 2017).

Estes novos registros do cauré são extremamente importantes, pois trata-se de uma espécie incomum na região leste do estado de São Paulo, cuja ocorrência vem aumentando nos últimos anos (eBird 2026, WikiAves 2026). Uma das localidades do leste do estado com maior concentração de registros desta espécie é o Legado das Águas, maior reserva privada de Mata Atlântica do país, que tem na observação de aves uma das principais atividades turísticas. Com base localizada no município de Miracatu, a reserva tem mapeado dois territórios já em uso por mais de quatro anos, por diferentes casais da espécie, com relatos de reprodução (B. Matinata obs pess.). Os demais registros, principalmente no litoral, são provavelmente de aves vagantes e se dispersando, pois são registros ocasionais de poucos dias na mesma localidade (Bokermann e Pivelli 2019, eBird 2026, WikiAves 2026).

Produzir, analisar e publicar dados sobre novos registros ou ampliações de ocorrência de espécies - seja em áreas urbanas ou não - é essencial para identificar possíveis adaptações de comportamento e/ou dieta e ocupação de nichos, informações básicas a nível de população, uso de habitat e área de ocorrência, gerando dados que possam ser utilizados em ações de educação, manejo e conservação.

5 CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES

BM, FM e VSC: Conceituação, Investigação e Revisão técnica; FS: Conceituação, Administração do projeto, Curadoria de dados, Redação – versão original, revisão e edição.

6 CONFLITOS DE INTERESSES

Os autores declaram não haver conflitos de interesses relacionados à publicação do manuscrito.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Legado das Águas pela autorização de uso dos dados obtidos em Miracatu e a um revisor anônimo pela importante revisão do manuscrito.

REFERÊNCIAS

- Antunes AZ, Santos AMR, Eston MR. 2008. Registros relevantes de aves para a Grande São Paulo obtidos no Parque Estadual da Cantareira. *Revista do Instituto Florestal* 20: 221-224.
- Bencke GA, Dias RA, Bugoni L, Agne CE, Fontana C, Mauricio GN, Machado D. 2010. Revisão e atualização da lista das aves do Rio Grande do Sul. *Iheringia, Série Zoologia* 100: 519-556.
- Bokermann M, Pivelli SRP. 2019. Avifauna de Bertioga – Inventários do Clube de Observação de Aves de Bertioga. *Unisanta Bioscience* 8: 218-249.
- Dores FT, Melo MA. 2020. Revisão dos registros do cabecinha-castanha *Pyrrhocomma ruficeps* (Passeriformes: Thraupidae) para a Região Metropolitana de São Paulo, SP, Brasil. *Atualidades Ornitológicas* 216: 8-12.
- eBird. 2026. eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca. Disponível: <<http://www.ebird.org>>. Acesso: 28 abr. 2026.
- Figueiredo LFA. 2020. Lista das aves do município de São Paulo. Versão: 6/5/20209. Disponível: www.ceo.org.br. Acesso: 28 abr. 2026.
- Pacheco JF, Silveira LF, Aleixo A, Agne CE, Bencke GA, Bravo G, Brito GRR, Cohn-Haft M, Mauricio GN, Naka LN, Olmos F, Posso S, Lees AC, Figueiredo LFA, Carrano E, Guedes RC, Cesari E, Franz I, Schunck F, Piacentini VQ. 2021. Annotated checklist of the birds of Brazil by the Brazilian Ornithological Records Committee – second edition. *Ornithology Research* 29: 94-105.
- Pallinger F, Menq W. 2021. Aves de rapina do Brasil. Diurnos. São Paulo: Pallinger Arte & Vida Selvagem. 184p.
- Rivas-Fuenzalida T, Burgos-Andrade K, Bierregaard RO, Kirwan GM. 2025. Bat Falcon (*Falco rufigularis*), version 2.0. In: Medrano F, Kirwan GM, Keeney BK (Eds.). *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca. Disponível: <https://doi.org/10.2173/bow.batfal1.02>. Acesso: 15 abr. 2026.

São Paulo. 2025. Inventário da fauna silvestre do Município de São Paulo. Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, Divisão da Fauna Silvestre. São Paulo: dez. 2025. Disponível: https://prefeitura.sp.gov.br/web/meio_ambiente/w/publicacoes_svma/4162. Acesso: 28 abr. 2026.

Schunck F. 2008. As aves do município de São Paulo, conhecimento histórico, diversidade e conservação. In: Malagoli LR, Bajesteiro FB, Whately M. (Org.). Além do concreto, contribuições para a proteção da biodiversidade paulistana. São Paulo: Instituto Sócio Ambiental – ISA. p. 270-313.

Schunck F, Pacheco JF, Antunes AZ, Gagliardi RL, Silveira LF. 2018. A review of the ornithological knowledge of the northern Serra do Mar mountains in the state of São Paulo, southeastern Brazil. *Revista Brasileira de Ornitologia* 26: 15-44.

Schunck F, Diniz GF, Zimback LB, Matsuda SM, Matos LA, Ruy GR, Mata R, Carmo RA, Magalhães AF. 2025. Occurrence of the great black hawk (*Buteogallus urubitinga*) in the largest urban area of South America. *The Raptor Journal* 19: 1-8.

Sick H. 1997. *Ornitologia brasileira*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 862 p.

Tonetti VR, Rego MA, De Luca A, Develey PF, Schunck F, Silveira, LF. 2017. Historical knowledge, richness and relative representativeness of the avifauna in the largest native urban rainforest in the world. *Revista Brasileira de Zoologia* 34: 1-18.

WikiAves. 2024. WikiAves. A Enciclopédia de Aves do Brasil. Disponível: <http://www.wikiaves.org.br>. Acesso: 28 abr. 2026.

Willis EO, Oniki Y. 2003. *Aves do estado de São Paulo*. Rio Claro: Ed. Divisa. 398 p.).